



**Purifarma**



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

## CIMETIDINA

A Cimetidina é um antagonista dos receptores H<sub>2</sub> da histamina que inibe a secreção ácida gástrica basal e noturna. Também inibe a secreção ácida gástrica estimulada por alimentos, betazol, pentagastrina, cafeína e insulina. Cimetidina é bem absorvida no trato gastrointestinal, a velocidade de absorção é retardada com os alimentos, é metabolizada no fígado, é eliminada na sua maioria, por via renal; 10% por via fecal, e também é excretada no leite materno.

### INDICAÇÕES:

A Cimetidina é indicada na profilaxia e tratamento da úlcera péptica. Síndrome de Zollinger-Ellison. Refluxo gastroesofágico. Úlceração e hemorragia gastrointestinal alta.

### DOSE

Adulto: úlcera duodenal: 300mg 4 vezes ao dia ou 400mg, 2 vezes ao dia, ou 800mg, antes de deitar. Profilaxia da úlcera duodenal recorrente: 400mg ao deitar. Úlcera gástrica benigna ativa e síndrome de Zollinger-Ellison: 300mg, 4 vezes ao dia. Dose máxima para adultos: de 2 a 4g/dia. Criança: 20 a 40mg/kg, 4 vezes ao dia.

### REAÇÕES ADVERSAS:

Reações ocasionais: diarreia, tontura, sonolência, cefaléia, náusea, vômito.

### PRECAUÇÕES:

- O tempo de tratamento de úlcera duodenal é, usualmente, de 8 semanas, mas deve-se continuar a terapia até o 8º mês mesmo que os sintomas da úlcera duodenal tenham desaparecido.
- O efeito terapêutico ótimo na forma oral é atingido quando tomado junto com as refeições e ao deitar.
- Pode administrar um antiácido, durante a terapia com Cimetidina, para o alívio da dor; no entanto, é necessário defasar de meia a uma hora as ingestões de ambos.

### INTERAÇÕES:

A Cimetidina pode reduzir a eliminação de todo medicamento que requeira metabolismo hepático como anticoagulantes orais, derivados cumarínicos, benzodiazepínicos, metoprolol, metronidazol, propranolol, cafeína, teofilina. Pode aumentar o risco de neutropenia ou outras discrasias sangüíneas ao administrar depressores da medula óssea. A administração simultânea de cetoconazol faz com que este tenha reduzida sua absorção pelo aumento do pH gastrointestinal pela Cimetidina.

### CONTRA-INDICAÇÃO

A Cimetidina é contra-indicada em pacientes com hipersensibilidade à droga. O risco/benefício deverá ser avaliada em pacientes com cirrose ou disfunção hepática grave e disfunção renal. Gravidez, lactação.