



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

EZETIMIBA

Ezetimiba é um inibidor da absorção do colesterol que é glucuronidado no fígado após sua rápida absorção nos enterócitos, onde juntamente com os seus metabólitos, exerce as suas ações hipolipidêmicas, reduzindo a absorção do colesterol através da inibição do transporte do colesterol por enzimas transportadoras específicas. Esta droga pode ser utilizada uma vez ao dia, em função de sua meia-vida plasmática prolongada e normalmente é muito bem tolerada.

A eliminação da ezetimiba e de seus metabólitos é feita principalmente pela excreção fecal. Em geral, o uso da ezetimiba isolada promove modestos efeitos no LDL plasmático, entretanto, quando combinada às estatinas, importantes mudanças no perfil lipídico podem ser observadas.

INDICAÇÕES: É indicado como terapia adjuvante à dieta para a redução do colesterol total elevado (C-total), do colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), da apolipoproteína B (Apo B) e dos triglicérides (TG) e para aumentar o colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-C) em pacientes com hipercolesterolemia primária (familiar heterozigótica e não familiar). Hipercolesterolemia Familiar Homozigótica (HFHo)

EZETROLTM, administrado em associação com uma vastatina, é indicado para a redução dos níveis elevados de colesterol total e do LDL-C em pacientes com HFHo. Os pacientes também poderão receber tratamentos adjuvantes (por exemplo, aferese de LDL). Sitosterolemia Homozigótica (Fitosterolemia) EZETROL é indicado para a redução dos níveis elevados de sitosterol e campesterol em pacientes com sitosterolemia familiar homozigótica.

DOSES E USO: Doses diárias recomendadas 10mg por dia.

REAÇÕES ADVERSAS/PRECAUÇÕES:

A ezetimiba administrado isoladamente: cefaléia; dor abdominal e diarreia. Ezetimiba coadministrado com uma vastatina: cefaléia, fadiga; dor abdominal, constipação, diarreia, flatulência, náuseas; aumento de ALT, aumento de AST; mialgia. Ezetimiba co-administrado com fenofibrato: dor abdominal.

CONTRA-INDICAÇÕES: Não usar durante a gravidez e amamentação, pois expõe a criança ao risco de nascer com malformações; Pacientes com problemas no fígado e Pacientes com alergias ao medicamento

REFERÊNCIAS

BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO, Y. Formulário Médico Farmacêutico. 3ªed, São Paulo: Pharmabooks, 2006.

<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/Ezetimiba.pdf>