

FLUFENAZINA HCL

PSICOTRÓPICO

Uso: Interno

CAS: 146-56-5

Fator de Correção: Não se aplica

PM: 510,4

Fator de Equivalência: 1,0

FM: C₂₂H₂₆F₃N₃OS. 2HCl

Indicações

A **Flufenazina** se utiliza para tratamento de diversos transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia, ansiedades graves, transtornos de comportamento e para tratamento de manias, em casos de transtorno bipolares.

Administra-se por via oral, na forma de cloridrato.

Recomendação de uso

A dose usual inicial de **Flufenazina HCl** é de 2,5 à 10mg/dia, divididos em 2 ou 3 tomadas, por via oral. A dose para o tratamento pode aumentar até 20mg/dia. Para idosos não são recomendadas doses maiores que 10mg/dia.

As doses podem reduzir-se posteriormente para uma dosagem de manutenção, de 1 à 5mg/dia.

Reações Adversas

A **Flufenazina** pode apresentar efeitos adversos como xerostomia, tremores, dificuldade de micção, visão embaçada, entre outros menos comuns. É menos propensa a causar sedação, hipotensão e efeitos antimuscarínicos, porém tem maior incidência de causar efeitos extrapiramidais.

Precauções

A **Flufenazina** pode exacerbar a depressão, portanto está contra indicada em pacientes com depressão grave. Deve ser utilizada com cautela em pacientes com insuficiência hepática, renal, cardiovascular, com diabetes e função respiratória deficiente.

Interações

As interações mais conhecidas devem-se a sua administração com fármacos com ação farmacológica semelhante. Os sintomas de depressão do SNC podem potencializar-se com o uso de outros fármacos depressores do SNC, álcool, anestésicos em geral, hipnóticos, ansiolíticos e opióides.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1.

Referências Bibliográficas

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.

Última atualização: 20/08/2013 MJM