

LITERATURA

USO: Externo

CAS: 67-73-2

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C24H30F2O6

Fator de Equivalência: 1

PM: 452,491

DCB: 04159

FLUOCINOLONA ACETONIDA

ANTI-INFLAMATÓRIO TÓPICO

Fluocinolona acetone é um adrenocorticoide fluorado de uso tópico que possui uma potente atividade terapêutica anti-inflamatória, anti-exudativa e antipruriginosa. Inibe a migração e o acúmulo de material celular (leucócitos, macrófagos, células inflamatórias). Processos tardios, como a deposição de colágeno e formação de quelóide, também são inibidos pelos adrenocorticóides.

Recomendação de uso

Aplicar uma fina camada sobre a região afetada, creme 0,01 a 0,2%, duas a quatro vezes ao dia.

Aplicações

- ✓ Tratamento de dermatites alérgicas, dermatites de contato, dermatose, eczema, psoríase, pruridos, lúpus eritematosos discoidal e alopecia areata.

Contra indicações

Fluocinolona acetone é contra-indicada em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade a alguns dos componentes da fórmula. Dermatites fúngicas ou virais, acne rosácea, dermatites infectadas.

Reações adversas

Podem ocorrer reações locais: sensação de calor, prurido, irritação, ressecamento, foliculite, hipopigmentação, atrofia e estrias da pele, e erupções acneiformes.

Precauções

Não usar nos olhos ou ao redor deles.

Não usar atadura, tira ou faixa na área tratada, a não ser por orientação médica.

Para diminuir a possibilidade de absorção significativa dos adrenocorticóides, durante o tratamento prolongado, estes podem ser interrompidos periodicamente, ou pode-se aplicar doses menores ou tratar apenas algumas áreas do corpo de cada vez.

Uso prolongado pode desencadear reações de taquifilaxia

Referência Bibliográfica

1. Dicionário de especialidades farmacêuticas, 2016.

Ultima atualização: 13/01/2017 BP.