

Uso: Interno

PM: 223,75

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C₁₃H₁₇N.HCl

Fator de Equivalência: 1,00

SELEGILINA HCL

PSICOTRÓPICO

Indicação

A **Selegilina** é um inibidor da monoamino-oxidase, que inibi principalmente a oxidação da dopamina, portanto apresenta uma ação ativadora dos neurônios dopaminérgicos.

A **Selegilina** é utilizada por via oral, na forma de **Cloridrato de Selegilina**. É indicada no tratamento de doença de Parkinson, parkinsonismo sintomático e outras doenças degenerativas do sistema nervoso central.

Posologia

As doses indicadas de **Cloridrato de Selegilina** são de 2,5 a 10 mg ao dia.

Efeitos Adversos

O **Cloridrato de Selegilina**, em monoterapia, pode causar alguns efeitos adversos como insônia, vertigens ou tonturas, cefaléias, náuseas e outras alterações gastrintestinais.

Precauções

O **Cloridrato de Selegilina** não deve ser usado durante a gravidez e lactação. Não deve ser administrado à noite, pois pode produzir insônia. Durante o tratamento, deve-se realizar o controle periódico da função hepática.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1

Referências Bibliográficas:

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.
3. [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM\[25578-1-0\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[25578-1-0].PDF) – Acesso em 08/11/2013

Última atualização: 15/08/2013 MJD

