

UNDECANOATO DE TESTOSTERONA

TESTOSTERONA UNDECILATO

Undecanoato de testosterona é um éster lipofílico da testosterona natural, ativo pela via oral, através da absorção, pelo sistema linfático, escapando desta maneira da inativação hepática. O tratamento com Undecanoato de testosterona aumenta os níveis plasmáticos de testosterona e seus metabólitos ativos, mantendo um efeito terapêutico constante. Seu uso é bem tolerado e, ao contrário dos outros derivados oralmente ativos da testosterona, não afeta a função hepática.

Recomendação de uso

A dose inicial necessária geralmente está entre 120 a 160 mg por dia, durante 3 semanas. A dose subsequente (40-120 mg por dia) baseia-se no efeito clínico obtido durante as primeiras semanas de tratamento. Tomar preferencialmente após as refeições.

Aplicações

Na terapêutica de reposição da testosterona nos distúrbios hipogonadais masculinas, como: após castração, eunucoidismo, hipopituitarismo, impotência de origem endócrina, sintomas do climatério masculino, tais como diminuição da libido e das atividades mental e física, certos tipos de infertilidade devido a distúrbios de espermatogênese. A terapêutica com testosterona também pode ser indicada na osteoporose originada pela deficiência androgênica.

Contraindicações

Em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Suspeita ou caso confirmado de carcinoma mamário ou prostático.

Reações adversas

Priapismo e outros sinais de estimulação sexual excessiva; em meninos pré-púberes, desenvolvimento sexual precoce, aumento da frequência de ereções, aumento de pênis e fechamento prematuro das epífises; oligospermia e diminuição do volume ejaculado; retenção hidrossalina.

Referências bibliográficas

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE - Guia Completo de Consulta farmacoterapêutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. DEF- Dicionário de Especialidades Médica, 2009/10. Editora de Publicações Científicas LTDA.

Última atualização: 24/07/15 BP.